



Τα κολπικά υπόθετα ProgyneL® είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που συμβάλλει στη θεραπεία και την πρόληψη κολπικών λοιμώξεων που προκαλούν την ανισορροπία του κολπικού μικροβιώματος.

Τα κολπικά υπόθετα ProgyneL® προάγουν την αποκατάσταση και διατήρηση της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας του κόλπου και της φυσιολογικής τιμής του pH, χάρη στην παρουσία του προβιοτικού οξεόφιλου γαλακτοβάκιλλου (*L. acidophilus*), των γαλακτο-ολιγοσακχαριτών (GOS) και του γαλακτικού οξέος, τα οποία προστατεύουν τη βλεννογόνο του κόλπου από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Τα κολπικά υπόθετα ProgyneL® αποκαθιστούν την ισορροπία του κολπικού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στην πρόληψη των υποτροπιάζουσών κολπίτιδων και βελτιώνοντας τη γενική υγεία της ευαίσθητης περιοχής.

Κλινικές ενδείξεις:

Τα κολπικά υπόθετα ProgyneL® ενδείκνυται για ενήλικες γυναίκες στη θεραπεία της βακτηριακής κολπίτιδας, της κολπικής καντιντίασης, ακόμη και ασυμπτωματικής, καθώς και σε περιπτώσεις διαταραχής της κολπικής ισορροπίας λόγω παρατεταμένης αντιβιοτικής αγωγής ή ορμονικών διαταραχών.

Σύνθεση:

Κάθε κολπικό υπόθετο των 2 g περιέχει: Ημισυνθετικό γλυκερίδιο, Πολυσορβικό 80, Πυρίτιο, Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (1 mg), οξεόφιλο Γαλακτοβάκιλλο (*Lactobacillus acidophilus*) (0,07 mg), Γαλακτικό οξύ (2 mg).

Συνιστώμενη δοσολογία:

Συνιστάται η χρήση 1 υπόθετου την ημέρα, για 10 συνεχόμενες ημέρες, το οποίο εισάγεται στον κόλπο πριν από τον ύπνο. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί, αν χρειαστεί, ή σύμφωνα με ιατρική σύσταση.

Τρόπος χορήγησης:

Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πλύνετε καλά την ευαίσθητη περιοχή.
- Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας πριν αφαιρέσετε την ταινία από τη συσκευασία.
- Αποκολλήστε μία μόνο κυψελίδα από την ταινία προσέχοντας να μην καταστραφούν οι υπόλοιπες κυψελίδες.
- Αφαιρέστε το υπόθετο από την κυψελίδα.
- Εισάγετε απαλά το υπόθετο στον κόλπο, ωθώντας το αρκετά βαθιά ώστε να αποφευχθεί η τυχαία έξοδός του.

Προφυλάξεις:

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για κολπική χρήση. Να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους ενδείκνυται. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ακέραιο κολπικό βλεννογόνο. Να μην χρησιμοποιείται εάν ο βλεννογόνος έχει υποστεί βλάβη ή εάν υπάρχουν κολπικές αλλοιώσεις. →

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση οξείας κολλικής λοίμωξης ή συγχορηγούμενων φαρμακευτικών θεραπειών, χωρίς ιατρική συμβουλή. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, αίσθημα καύσου ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αντίδραση λόγω υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα συστατικά, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Να μη χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο χωρίς ιατρική συμβουλή. Κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση. Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης. Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία δεν είναι άθικτη. Η ημερομηνία λήξης ισχύει μόνο για προϊόν που φυλάσσεται σωστά και σε άθικτη συσκευασία. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υγείας και να αναφέρετε τις πληροφορίες στον τοπικό διανομέα, τον κατασκευαστή ή τις τοπικές Αρχές Υγείας.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 25 °C, μακριά από άμεσο φως και πηγές θερμότητας.

Συσκευασία:

10 κολλικά υπόθετα των 2 g

Αναθ. 00 - 06/2025



Διανομέας:

GENOVA HEALTH IKE

Λεωφ. Μεσογείων 2-4

11527 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: 212 213 3017, 210 7474755



Fertiland
Genova

Αρχές Υγείας:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284,

15562, Χολαργός, Ελλάδα



Κατασκευαστής:

PHARMA BIOMATECK srl

Consorzio Fracta Labor L25

80027 Frattamaggiore (NA) - IT



REF

PB.05.24.V.0

PG.DM.05.24.V.0.F.00